花包于尿道口

追炎症之刺激症狀。不甚劇烈時。可行尿道注射法 o受診前。須留尿不放 立即洗滌消毒。否則慢入目中。即病胀睛。 。以待醫生診查。 。接觸于局部之手指

證保實切有用信求務版出

往入藥改。通常應用四百倍至五十倍之蛋白化銀 以洗淨尿道粘膜。得使藥液呈其作用。約聯 時。不可間斷。即分泌物已止之後。仍宜持續一二週。 切不可急速。官以緩徐為貴。否則易於誘起鄰近器官之炎 在射器之尖端安放尿道1°以左手指頭。把特尿道:唇 **於欲行注射時。官將容藥液之注射器。向上應進** 注射遇早 · 則後日當有反覆之處 · 設起副墨九炎膀胱炎 · 紙護炎等 · 則常停止 注射既畢 · 尚須把握患者之尿道口 · 約縣七八分鐘之久 · 以遏注被之流出



水盈盈寒水矚。曼聲低唱斷腸曲。 吳江女兒行 曲訴心頭事。分明道去相思字。 《有女貌如花。解凍溪邊獨浣紗 計解卿愁。翩然笑傲湖山色。 只斷腸客。愴懷不禁青衫濕。 (無言)

一四,作於吳江

(戊)急病隨語

共川 四 八 一 第 (日二十月二年九十國民) ◆ 分 二 洋 售 份 毎 ▶ □路南雲路馬三海上址館 第

(乙)門診一元 (丁)膏丸方四元 (丙) 出黔四元 甲)特號二元 三九四

醫士楊志一著-

可謀挽救之策

冰釋

子二十而冠。三十

是保護和負担。但是

走馬 胎更妙 門。彈丸入 一層洋釘等刺 中。彈丸入

成滴入均可。 水片五分。

********** 好嘴之。數 水酒各 海內高明

止景。 効堅 者知一以經。 內陽之面的 一時期 內別 一時期 一時期 內別 一時期 一時期 內別 一時期 一時期 一時期 內別 一時期 一時期 一時期 內別 一時期 一 礬

(4) 文文文文文文

个報發行部啓事

四君公婆敵報優待期內認承題臘定 五起 一集彙訂立時告罄茲為酬答讀 致第一集彙訂之時告罄茲為酬答讀 致第一集彙訂者均已按嫌寄奉 而未得第一集彙訂者均已按嫌寄奉 一一元特價八角)以作家庭之顧問之 一一元特價八角)以作家庭之顧問健 一一元特價八角)以作家庭之顧問健

散

之。是佐湯劑。初八七靈火喉痛喉腫喉間糜爛。吹 沈熊環

樂成。分再服。病從小便出。並無潤通大便之文。 髮煎導之。解者謂。穀氣實者。大便結而不通。是以陽明下 者。果何所見而云然。即據太醫尉史脫家婢黃病

自觚有女

稿投迎權

N.

陰吹治法叢考

(方公溥)

²***************

XXXXX

陰吹症治不一。而實髮煎